

# ¿Qué hacer si encuentras una cría de murciélago? Guía para devolverla al refugio o reunificarla con su madre

Guía orientativa

Versión 2 del 23 de febrero de 2025

## Introducción

Cada año, entre los meses de mayo y julio (época en la que se produce el nacimiento de los murciélagos), la [SECEMU \(Asociación Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos\)](#), recibe múltiples avisos indicando que se ha encontrado en el suelo o una pared lo que parece una cría de murciélago. En la mayoría de los casos, la cría se encuentra en las inmediaciones de un refugio del que se ha caído, ya que es demasiado pequeña para volar y regresar al punto del que ha salido.

Las hembras de murciélago forman colonias de cría o de maternidad cuyo número de individuos varía desde unos pocos hasta varios cientos. Los murciélagos son mamíferos, por lo que las hembras paren a sus crías y las amamantan durante varias semanas.

La experiencia nos dice que lo mejor para las crías es que vuelvan a su entorno, con su madre, aumentando así su probabilidad de supervivencia. Para que esto ocurra es necesario realizar una de las siguientes acciones:

- **Devolver directamente la cría al refugio:** cuando, tras localizar el refugio, podemos reubicar a la cría en el mismo.
- **Reunificar a la cría de murciélago con su madre:** cuando ha sido imposible devolver la cría al refugio y se favorece el escenario para que la madre vuelva a por ella.

El objetivo de este documento es servir de apoyo para poder llevar a cabo este proceso de vuelta de la cría de murciélago a su entorno.

Las personas destinatarias de esta guía son aquellas que se encuentren una cría y que, tras contactar con SECEMU o el Centro de Recuperación de Fauna correspondiente y se confirme que es una cría en buen estado, decidan ayudar al animal localizando su refugio y reunificándola

con su colonia o su madre. En estos casos una actuación rápida es imprescindible para el rescate del animal.

Recaltar que las acciones descritas en esta guía siempre se realizarán bajo una supervisión indirecta de profesionales y nunca con contacto directo con el animal.

**IMPORTANTE:** En este punto, es imprescindible recordar que **los murciélagos son animales silvestres y por lo tanto no se deben manipular directamente**. Como en otros muchos animales silvestres, existe el riesgo de que al poder estar herido o sentirse acorralado, nos muerda para defenderse y, en algunos casos, muy improbables, nos pueda transmitir alguna enfermedad, como la rabia. Es importante dejar claro que menos del 1% de los murciélagos sanos son portadores de este virus ([más información aquí](#)) y en España nunca nadie ha muerto por rabia de murciélago. Aun así, por principio de precaución, si se encuentra un murciélago y es necesario manipularlo, **es imprescindible la utilización de guantes o el empleo de una barrera física**, como un trapo, para contener al animal de forma que no exista contacto directo con él. Si por accidente se sufriera la mordedura de un murciélago, se debe lavar la herida con agua y jabón durante 10-15 minutos y aplicar antiséptico. Y acudir a urgencias del hospital a la mayor brevedad posible para que nos apliquen [la profilaxis posexposición a la rabia](#). La vacuna de la rabia, es una vacuna hospitalaria que no suelen tener los centros de salud, completamente segura, 100% eficaz y que se administra de forma protocolaria por principio de precaución.

## Etapas para la vuelta de la cría a su refugio

Como ya se ha indicado, la cría puede volver a su refugio de dos formas:

- **Devolución directa de la cría al refugio:** cuando tras localizar el refugio podemos reubicar a la cría en el mismo.
- **Reunificación de la cría de murciélago con su madre:** cuando ha sido imposible devolver la cría al refugio y se favorece el escenario para que la madre vuelva a por ella.


Los distintos pasos para llevar a cabo la vuelta de la cría a su refugio son los siguientes (es importante seguirlos uno a uno por el orden indicado):

1. Confirmación de que se trata de una cría.
2. Conocer cuál es su estado general.
3. Localización de su refugio.
4. Devolución directa de la cría al refugio.
5. Confinamiento y mantenimiento de la cría (si no ha sido posible la devolución directa).
6. Reunificación de la cría con su madre al anochecer.

# 1. Confirmación de que se trata de una cría

**IMPORTANTE:** Esta guía no reemplaza los consejos de un experto/centro de recuperación de fauna, y debe utilizarse bajo las indicaciones de un profesional.

Lo primero, que debemos hacer es asegurarnos de que el murciélago que nos hemos encontrado es una cría. Para ello, no podemos fiarnos del tamaño ya que hay especies que son pequeñas y pueden dar lugar a confusión. **La manera correcta de reconocer a las crías de murciélago es observando su pelo:**



- Las crías con pocos días **no tienen pelo (su color es rosado)** y, además, tienen los **ojos cerrados (etapa A)**.
- A las crías que tienen más días, se les aprecia **algo de pelo de color gris**, aunque predomina el **color rosado de la piel (etapa B)**.
- La cría ya tiene pelo, muy corto, de color gris y apariencia **aterciopelada**. Bajo el pelo es **apreciable la piel ya menos rosada**. Además, se aprecia su **cuerpo bajo el pelo (etapa C)**.
- En la **etapa D el pelo es más largo**, particularmente en el cuerpo, pero todavía tiene un **aspecto de terciopelo corto** y suele ser de **color grisáceo**.
- En la **etapa E** las proporciones todavía **no son de adulto pero** tienen un **aspecto similar**, con orejas y hocico más sobresalientes que en los adultos, lo que les confiere un **aspecto "desgarbado"**. En esta etapa **las crías ya han empezado a volar** y han sido parcialmente destetadas.

Esta guía explica en detalle **qué hacer si te encuentras crías en las etapas A-C**.

Para las crías en etapas D-E que no se puedan devolver al refugio directamente, es imprescindible contar con ayuda especializada para el rescate.

	
<p><b>Cría en etapa A</b> © Silvia M<sup>a</sup> Cabezas León</p>	<p><b>Cría en etapa A</b> © Silvia M<sup>a</sup> Cabezas León</p>
	
<p><b>Crías en etapa B</b> © Sandra Córdoba Lloria</p>	<p><b>Cría en etapa C</b> © Ana Pino-Blanco</p>

## 2.Cuál es su estado general

**Las crías se deshidratan rápidamente** si no tienen acceso a leche materna y esto se evidencia de forma muy clara en su aspecto exterior, ya que **se observan los hombros muy marcados y la cintura muy estrecha**, apreciándose una típica forma de corazón (como se puede ver en la siguiente imagen).

	
<p><b>Cría (etapa A) con aspecto saludable</b> © Ana Pino</p>	<p><b>Cría (etapa B) severamente deshidratada</b> © Sue Worsfold</p>

Por lo tanto, cuando nos encontremos a una cría, lo primero que debemos preguntarnos es: **¿Cuánto tiempo lleva esta cría separada de su madre?**

- Si creemos que **lleva poco tiempo**, ya que muestra un **aspecto saludable**, pasaríamos al siguiente punto "**Localización del refugio**".
- En caso contrario, si observamos que **está muy deshidratada**, deberíamos llamar y/o **llevarla al Centro de Recuperación de Fauna más cercano**.

### 3. Localización de su refugio

Si creemos que **la cría lleva poco tiempo separada de su madre**, el siguiente paso sería **intentar localizar su refugio**.

Si hemos encontrado a la cría cerca de un edificio o pared, es muy probable que haya un refugio cercano, probablemente en la parte de arriba de la pared, del tejado, en un hueco de la ventana, el cajetín de una persiana, el aparato del aire acondicionado o en alguna otra grieta similar.

Muchas veces hay pequeños excrementos negros (similares a los de ratón, pero de aspecto brillante si les da la luz) pegados a la pared cerca de la entrada del refugio o en el suelo, justo debajo de la fisura que da acceso al refugio.

Podemos confirmar los indicios de un posible refugio esperando hasta el atardecer, con el objetivo de ver si salen murciélagos del mismo.

Si tras las indagaciones **se localiza el refugio**, pasaremos al siguiente punto "**Devolución directa de la cría al refugio**".

	
<p><b>Grieta entre la viga y la pared</b> © Ana Pino-Blanco</p>	<p><b>Grieta en edificio a la altura del tejado</b> © Isabel María Báez Román</p>
	
<p><b>Grieta entre dos edificios</b> © Sonia Sánchez-Navarro</p>	<p><b>Grieta bajo un alero</b> © Catherine Dew</p>

## 4. Devolución directa de la cría al refugio

Si **se localiza el refugio**, y el acceso al mismo es seguro, se puede **intentar devolver la cría directamente**. Si se encuentra alto, pero accesible desde una escalera, la utilizaríamos para situar a la cría sobre la pared, cerca de la abertura, dejando que trepe hacia arriba, hacia su interior. Normalmente, escucharemos de la grieta el sonido de las otras crías llamando a sus madres.

Si el refugio está a una mayor altura, se puede intentar acercar la cría al mismo utilizando distintas estructuras como un palo de pintor sujeto a un colador, donde se coloca una tela de base para crear una superficie de agarre cómoda sobre la que dejaremos a la cría de forma segura.



**Extensión para acercar las crías al refugio**

©Laura Carter



**Extensión para acercar las crías al refugio**

©Rose-Anne Movsovic

**Extensión para acercar las crías al refugio**

© Bethan Moseley

## 5. Confinamiento y mantenimiento de la cría (si no ha sido posible la devolución directa)

Si es imposible devolver la cría al refugio, ya sea por aspectos de seguridad o porque el refugio no ha sido identificado, debemos **mantener a la cría con vida y a salvo hasta la noche**, para volver a intentar la reunificación de nuevo.

Para esto, mantendremos a la cría en una caja (por ejemplo, de zapatos) con un trapo o papel de cocina para que pueda esconderse. La caja debe contar con pequeños orificios (menores que la punta del dedo meñique) para que tenga ventilación pero no permita que la cría escape.

Dejaremos la caja cerrada, en un lugar tranquilo, sin exposición directa al sol.

Las crías muy pequeñas no son capaces de mantener el calor por lo que es importante **colocarle una fuente de calor** cerca. Una botella de plástico con agua caliente tapada con un calcetín, una bolsa de semillas caliente, una manta térmica, o una bolsa de agua caliente son buenas opciones. Si optamos por colocar una botella rellena de agua caliente, iremos con mucho cuidado cuando movamos la caja, ya que la botella podría girar y aplastar a la cría. Además, es importante que no se deshidrate, por lo que ofreceremos (sin forzar) agua en gotitas con un pañuelo, trozo de tela o un pincel (limpio), o a través de una pequeña pipeta o jeringa (sin aguja y sin presionar el émbolo, dejaremos que el animal lama). Estas son formas cómodas y seguras de hacerlo (evitaremos hacerlo con bastoncillos de los oídos, ya que sus fibras se deshacen y pueden tragarlas).



**Bolsa de agua caliente**  
© Ana Pino-Blanco



**Cría (etapa E) bebiendo de una jeringa**  
© Sonia Sánchez-Navarro



**Manta eléctrica**  
© Sandra Córdoba Lloria



**Crías (etapa C) bebiendo de una jeringa con un aplicador de superglue acoplado**  
© Sandra Córdoba Lloria

## 6. Reunificación de la cría con su madre al anochecer.

---

La idea principal es que, **al atardecer, cuando llegue la puesta de sol**, se coloque **a la cría, protegida contra los elementos y de manera segura, en un lugar lo más cercano posible al sitio donde se encontró**, ya que el refugio estará cerca, **para que la madre pueda escucharla, sobrevolar y llevársela volando agarrada a su cuerpo**.

En todo este proceso es **importante que las crías no se enfríen**, ya que de lo contrario no estarán activas ni emitirán llamadas.

Hay diversos dispositivos caseros que pueden improvisarse para intentar la reunificación de la cría con su madre. El sistema debe constar de los siguientes elementos:

- Un **recipiente sólido a modo de plataforma**, tipo barreño o caja, con paredes lisas, para que la cría no pueda escaparse.
- En medio de dicho recipiente, se colocará una **estructura a modo de torre**, ligeramente más alta que los bordes del recipiente, como por ejemplo un rollo de papel de cocina u otra caja.
- Sobre la torre, se colocará una **fuentes de calor**, como un calentador de manos o una bolsa de semillas caliente, para que la cría no se enfríe.
- Se cubrirá toda la estructura (torre y fuente de calor) con **un trapo/tela/bolsa de tela**, donde colocaremos a la cría, de forma que pueda agarrarse, pero se debe evitar los pliegues para que la cría no pueda esconderse.
- Dicho recipiente con toda la estructura, debe ser **colocado relativamente alto** (mínimo a 2-3m), lo más cercano al refugio o si no se conoce, al lugar donde se encontró la cría. Se puede usar para su colocación, una escalera, una pértiga, una fregona o cualquier soporte que aporte estabilidad. Así mismo, se puede sujetar el recipiente a una estructura más alta, tipo valla, coche o similar.

Colocado todo el sistema, retírate de la zona para no resultar amenazante, pero mantente cerca a la espera de ver qué es lo que sucede.

**IMPORTANTE: Se debe tener especial cuidado para que la cría no quede al alcance de depredadores, especialmente gatos domésticos.**

[En el siguiente enlace, puedes ver un vídeo que muestra el proceso de reunificación de una madre murciélago con su cría y como juntas emprenden el vuelo:](#)

<https://youtu.be/A846wrYdt-E>, imágenes de © Javier Pérez-Tris.

A continuación se muestran algunos ejemplos de dispositivos de reunificación elaborados de manera casera:



© Joe Ireson



© Abi Gray



© Clare Rawcliffe



© Janel Knoop Hafer




© Sandra Córdoba Lloria



© Sandra Córdoba Lloria

**Distintos mecanismos para la reunificación de crías con su madre**



Dispositivo de reunificación utilizado en la cercanía a un refugio

© Javier Pérez-Tris



© Gail Armstrong



© Rose-Anne Movsovic



© Pippa Dunn



© Elbg Batcarer

**Distintos mecanismos para la reunificación de crías con su madre**

## ¿Qué puede ocurrir?

### A.- La madre recoge a la cría en la primera noche

La cría trepa hasta el borde de arriba o una esquina buscando refugio. Si está lo suficientemente caliente, emitirá sonidos de llamada al escuchar otros murciélagos volando por encima.

Los murciélagos adultos normalmente responden a estas llamadas, bajando e investigando. Incluso si no es la madre, es posible que algún murciélago adulto se pose y vuelva a volar. Es posible que los adultos se comuniquen entre sí la presencia de la cría.

**Si la madre llega, se posará y, posiblemente, esté durante unos minutos, alimentando a la cría, para después salir volando con ella.**



### B.- La madre NO recoge a la cría en la primera noche

Puede ocurrir que la madre no acuda en ese primer intento de reunificación. Uno de los motivos puede ser que esté herida o haya muerto, lo que pudo causar que la cría estuviera sola y cayera del refugio.

Por esto, si la cría **no es recogida durante la primera noche, comunícate con el grupo de recuperación de fauna más cercano** para que la recojan o con algún grupo especialista que pueda indicarte la mejor estrategia a seguir.

No obstante, por regla general se puede **intentar la reunificación durante 5-7 noches seguidas, en distintas localizaciones y tratando de encontrar líneas de vuelo entre los potenciales refugios y sitios de alimentación.** Esto sólo se puede intentar siempre y cuando durante el día, la cría se mantenga alimentada por personal especializado.

**Gracias por tu ayuda con estos animales fascinantes.**

**Comisión de Rescate de SECEMU**

[rescate@secemu.org](mailto:rescate@secemu.org)



Guía Orientativa "Devolver una cría de murciélago al refugio o reunificarla con su madre"		Versión 2 (23 de febrero de 2025)
Autoras	Ana Pino-Blanco Elena Tena López Silvia M <sup>a</sup> Cabezas León Sandra Córdoba Lloria Sonia Sánchez-Navarro	